



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE


I-131 THERAPIE (LAGE DOSIS)

NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Dr. R. Ahmad, dr. F. Soffers

Welkom op de dienst nucleaire geneeskunde.

In deze folder krijgt u uitleg over de behandeling van de schildklier met radioactief jodium, ook wel I-131 therapie genoemd.

Welkom



WERKING

Jodium is een natuurlijke stof die na toediening in sterke mate door de schildklier wordt opgenomen. Ook radioactief jodium wordt door de schildklier opgenomen en zendt in tegenstelling tot gewoon jodium straling uit. Hierdoor vindt een zeer lokale bestraling plaats van de hele schildklier of van te hard werkende zones in de schildklier.

I-131 kan gebruikt worden om een hyperthyroïdie (een te hard werkende schildklier) onder controle te brengen en/of om het volume van de schildklier te doen afnemen.

VOORBEREIDING

Eten net voor of na de inname wordt afgeraden.

Behandeling met strumazol of propylthiouracyl dient 5 dagen voor de toediening van I-131 onderbroken te worden.

Verder is er geen voorbereiding nodig.

BEHANDELING

De inname bestaat uit het inslikken van een kleine capsule met wat water. U merkt hier niets van en het is ook niet pijnlijk. U mag nadien onmiddellijk vertrekken.

NA DE BEHANDELING

De I-131 wordt na de inname in de schildklier opgenomen. Wat niet in de schildklier terecht komt, wordt de eerste 2 dagen via de urine uitgescheiden. Het I-131 dat in de schildklier wordt opgeslagen, zal zorgen voor een inwendige bestraling van de schildklier.

De eerste effecten zijn te verwachten vanaf 2 weken na de inname. Het volledige effect bereikt men na 2-3 maanden.

Behandeling van schildklieraandoeningen met I-131 bestaat al meer dan 50 jaar. Deze behandeling is veilig gebleken. Toch dienen er enkele maatregelen genomen te worden om de straling geen effect te laten hebben op de personen in uw omgeving.

MAATREGELEN VOOR PERSOONLIJKE HYGIËNE

(GEDURENDE DE EERSTE WEEK NA DE I-131 TOEDIENING, TOT EEN DOSIS VAN 15 MCI)

- De eerste twee dagen is het aan te bevelen om voldoende te drinken (1.5 tot 2 liter), zodat het radioactief jodium dat niet door de schildklier werd opgenomen sneller het lichaam verlaat via de urine.
- Na het plassen moet u de WC bril afvegen, het toilet twee keer doorspoelen en de handen goed wassen. Mannen worden verzocht zittend te plassen.
- Volg de toiletregels ook buitenshuis.

Vermijd contact met urine, bloed, braaksel, stoelgang en speeksel.

Bij onverwachte ziekenhuisopname in de week na de toediening van het I-131 dient u de arts hiervan op de hoogte te brengen.

MAATREGELEN VOOR CONTACT MET ANDERE PERSONEN

De uitgezonden straling neemt in belangrijke mate af met de afstand. Derhalve is afstand houden van andere mensen de belangrijkste manier om personen uit uw omgeving tegen de effecten van de radioactieve straling te beschermen.

Neem volgende voorschriften waar gedurende de **voorzichtigheidsperiode**:
(zie tabel verder voor de duur)

- Huisgenoten blijven best zoveel mogelijk op 2 meter afstand gedurende de voorzichtigheidsperiode, zeker bij langdurige bezigheden zoals TV kijken, eten of slapen. In de praktijk betekent dit vooral apart slapen.
- Kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Nauwe contacten op minder dan 2 meter afstand dienen echt beperkt te worden gedurende de voorzichtigheidsperiode. Dit geldt zeker voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. Een knuffel geven mag, een kind langere tijd op de schoot nemen is af te raden. Laat de kinderen zoveel mogelijk door uw huisgenoten verzorgen.
- Laat uw huisgenoten en elke verzorgende waarmee u langdurig contact heeft (kinesist of thuisverpleging) deze folder lezen.
- Indien u op reis gaat onmiddellijk na de behandeling, overlegt u dit best met uw arts. Houd er rekening mee dat u nog licht radioactieve stoffen in uw lichaam heeft. Deze geven slechts een minieme straling af die onschadelijk is, maar die wel gevoelige detectietoestellen in havens en luchthavens kunnen activeren.
- U kunt gewoon blijven doorwerken, tenzij u werkt met kinderen jonger dan 10 jaar, met zwangere vrouwen of tenzij u de afstandsregels zeer moeilijk op uw werk in acht kunt nemen. Ook hier dient u de **voorzichtigheidsperiode** te respecteren.
(Zie tabel op de volgende pagina)

Dosis	Tov huisgenoten, collega's en publiek	Tov zwangeren en kinderen < 6 jaar
8 mCi	8 dagen	16 dagen
10 mCi	10 dagen	20 dagen
12 mCi	12 dagen	24 dagen
15 mCi	15 dagen	30 dagen

Tabel: voorzichtigheidsperiode

BIJWERKINGEN

U zult van de I-131-inname geen hinder ondervinden.

Zeldzaam is er een tijdelijke gevoeligheid in de halsstreek, met wat pijn en zwelling ter hoogte van de schildklier, waarvoor u een klassieke pijnstiller kunt nemen.

Na de I-131 toediening is een regelmatige controle van de schildklierfunctie in samenspraak met uw behandelende arts of huisarts aanbevolen.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Radioactief jodium mag niet aan zwangere vrouwen worden toegediend. Ingeval van twijfel moet u uw arts verwittigen. Een zwangerschap dient 6 maanden uitgesteld te worden na een behandeling met radioactief jodium.

Borstvoeding moet gestaakt worden bij I-131.

URINE

In geval van urineverlies of incontinentie moet u de arts verwittigen op tel 011 826 212.



Heeft u nog vragen?

Stel ze dan gerust aan de arts, laborant of verpleegkundige of neem contact op met onze dienst nucleaire geneeskunde.

Tel: 011 826 210 of 011 826 212

Fax: 011 826 213



versie: 29 januari 2018

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be