



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

MODIFIED FOLFIRI

Uw therapie

Oncologisch begeleidingsteam

Deze infobrochure bevat een aantal tips en informatie die u van uw medisch specialist en de oncocoach krijgt. Thuis kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Deze informatiebrochure is enkel bedoeld als 'gids'.

☎ Indien u nog bijkomende vragen heeft, twijfel dan niet om contact op te nemen met de oncocoaches op het telefoonnummer 011 826 397 of per e-mail via oncocoach@noorderhart.be.

Waaruit bestaat deze therapie?

Deze therapie bestaat uit een combinatie van twee geneesmiddelen die invloed hebben op de celdeling: Irinotecan (Campto®) en Fluorouracil (5-FU).

De geneesmiddelen (ook wel cytostatica genoemd) hebben elk een eigen werking zodat de celdeling vanuit verschillende invalshoeken wordt afgeremd. Daarnaast krijgt u Leucovorin (Elvorine®). Dit is een soort vitamine en zorgt voor een betere werking van 5-FU.

Er worden nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen zoals misselijkheid te beperken.

De chemotherapie wordt gegeven op het niet-chirurgisch dagziekenhuis (C1). Er is geen overnachting aan verbonden.

Verloop van de therapie



Uw medisch specialist zal spreken over cyclussen.

Een cyclus begint altijd de eerste dag van de chemotherapie. Als uw bloeduitslagen en algemene toestand dit toelaten zal de volgende cyclus in principe 2 weken na dag 1 starten. De periodes tussen de chemotoedieningen zijn nodig voor het herstel van uw lichaam.

De eerste dag krijgt u Campto®, 5-FU en Leucovorin toegediend. Nadien wordt ook 5-FU in een folfusor® (pompje) gegeven dat gedurende 46 uren loopt via de poortkatheter. Het afkoppelen van het pompje gebeurt door een thuisverpleegkundige.

Een Folfusor® is een pompje waarmee u naar huis kunt gaan. Door middel van dit pompje zal gedurende 46 uur chemotherapie (5-FU) toegediend worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze infobrochure 'Folfusor®'.

Mogelijke bijwerkingen

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. De beleving van de bijwerkingen is voor iedereen anders.

Cytostatica (chemo) zijn celdodend en hebben invloed op de celdeling van de kankercellen, maar spijtig genoeg ook op gezonde cellen. De gezonde cellen hebben het vermogen om zich te kunnen herstellen, kankercellen kunnen dat veel minder goed.

Het optreden van bijwerkingen is een gevolg van dit proces. De bijwerkingen en de mate waarin, zeggen echter niets over het effect van de behandeling op de ziekte. Niet iedereen krijgt dezelfde bijwerkingen. Contacteer de oncocoach, verpleegkundige of uw huisarts/specialist bij klachten. Vaak kan advies of een kleine aanpassing voor een groot verschil zorgen.

ALGEMENE BIJWERKINGEN

- Verlaagd aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal rode bloedcellen en verlaagd aantal witte bloedcellen (met eventueel verhoogde kans op infectie)
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Ongewone vermoeidheid
- Huidveranderingen
- Invloed op de intimiteit en seksualiteit



MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN IRINOTECAN

- Diarree
- Eventuele constipatie is enkel het gevolg van de krachtige anti-emetica
- Haaruitval (20% van de patiënten)

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN FLUOROURACIL:

- Diarree
- Tranende ogen en lopende neus
- Huidreacties
- Zelden handvoetsyndroom (rode handpalmen en voetzolen met soms blaarvorming)

Voor uitleg en tips over de nevenwerkingen verwijzen wij u naar de algemene infobrochure 'Bijwerkingen bij chemotherapie'.

Veiligheidsmaatregelen

Uit onderzoek blijkt dat afvalproducten van cytostatica, die aanwezig zijn in urine, braaksel, ontlasting, vaginaal vocht en sperma, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Vooral verpleegkundigen die door hun beroep veelvuldig in contact komen met cytostatica, lopen daarbij een risico.

Daarom zult u merken dat de verpleegkundigen tijdens de behandeling maatregelen treffen, zoals het dragen van handschoenen en/of soms een mondmasker. Voor uitleg over de veiligheidsmaatregelen die u en uw naasten moeten treffen, verwijzen wij u eveneens naar onze algemene infobrochure 'Bijwerkingen bij chemotherapie'.

BIJ VOLGENDE KLACHTEN NEEMT U BEST ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW (HUIS)ARTS/ONCOCOACH:

- Koorts 2 maal 38,2°C of 38,5°C en hoger
- Koude rillingen
- Langdurige bloedneus (langer dan 30 minuten)
- Blauwe plekken, zonder dat u bent gevallen of u hebt gestoten
- Aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten)
- Braken langer dan 24 uur
- Diarree langer 48 uur
- Obstipatie (verstopping) langer dan 4 dagen
- Plotselinge huiduitslag

Wanneer u twijfelt of zich onzeker voelt over bepaalde klachten, neem dan gerust contact op met de oncocoach.

Notities





versie: 3 juni 2019

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be