



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

NA EEN TVT-O-OPERATIE

Gynaecologie-verloskunde

 011 826 100

U heeft een TVT-O-operatie ondergaan waarbij er onder de plasbuis een kunststofbandje ingebracht is via de vagina.

In deze patiëntenbrochure vindt u algemene informatie over wat te doen na een TVT-O-operatie.

NA DE OPERATIE

Na de operatie wordt u gevraagd een aantal keer te plassen. De verpleging kijkt na of u voldoende plast en of er niet te veel urine in de blaas achter blijft. Dit gebeurt met een apparaat dat op de buik geplaatst wordt en de achtergebleven urine scant.

Plast u goed en blijft er niet te veel urine achter? Dan mag u naar huis.

Lukt het niet onmiddellijk om goed te plassen? Dan kan het zijn dat u een dag langer moet proberen, of dat u tijdelijk met een blaassonde naar huis gaat en na een week opnieuw moet proberen.

Het wondje in de vagina kan enkele dagen een beetje bloedverlies geven. Dit kan overgaan in een bruinige tot gelige afscheiding gedurende enkele weken. De eerste dagen kunt u in beide liezen pijn voelen waarvoor u Dafalgan® of een ontstekingsremmer (zoals Brufen®, Voltaren®, ...) mag nemen.

De draadjes gebruikt om de wonde te hechten, lossen vanzelf op en moeten niet verwijderd worden.

DRINK VEEL EN GA REGELMATIG NAAR HET TOILET

Probeer anderhalve tot twee liter water per dag te drinken en ga regelmatig naar het toilet (minstens vijf keer per dag!).

De eerste weken treedt soms nog ongewild urineverlies op. Ook kunt u tijdelijk meer aandrang voelen. Sommige vrouwen hebben het gevoel 'over een weerstand' te plassen. Blijf dan een beetje langer op toilet zitten en pers niet mee.

VOORZORGSMAATREGELEN TOT 6 WEKEN NA DE OPERATIE

Na de operatie mag u douchen, maar liefst geen bad nemen tot de bloederige afscheiding is gestopt.

Tot 2 weken na de operatie:

Niet met de auto rijden (meerijden mag wel)

Tot 4 weken na de operatie:

Niet fietsen

Niet zwaar tillen bijv. boodschappen, kleine kinderen opheffen, ...

Geen seksueel contact

Tot 6 weken na de operatie:

Geen zwaar werk verrichten

VERWIKKELINGEN

Een operatie houdt altijd bepaalde risico's in, maar gelukkig zijn ernstige complicaties zeldzaam. Hieronder beschrijven we kort de verwikkelingen die bij een TVT-O-operatie kunnen voorkomen.

- In 5% van de gevallen (1 op 20) ontstaat de eerste dagen en weken na de operatie soms het gevoel dat u vaak moet gaan plassen; een drangblaas.
- Blaasontsteking, bloeding, tijdelijk niet kunnen plassen.
- Zeldzaam: er kan een letsel van de plasbuis of de blaas ontstaan waardoor de blaassonde langer aanwezig moet blijven. Een beschadiging van de blaas of urinebuis geneest meestal goed, maar vraagt een langere hersteltijd.
- Zeer zeldzaam: het plassen lukt niet en het bandje moet doorgeknipt worden.

CONTROLE

Zes weken na de operatie moet u op controle komen bij uw gynaecoloog. We raden u aan om bij ontslag uit het ziekenhuis meteen een afspraak te maken op het nummer 011 826 100.

Heeft u koorts, te veel bloedverlies of kunt u niet plassen? Dan moet u eerder contact opnemen!

versie: 11 oktober 2021

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be