



noorder  
hart excellente  
zorg

MARIAZIEKENHUIS  
INFOBROCHURE

# PORT-A-CATH



Geachte patiënt,

Voor uw behandeling is een regelmatige toediening van medicatie direct in de bloedbaan noodzakelijk. Daarom wordt een implanteerbaar toedieningssysteem (poortstelsel) aanbevolen.

Deze informatiebrochure beantwoordt een aantal algemene vragen over dit toedieningssysteem.

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft over het product of over de behandeling, dan kunt u deze steeds bespreken met uw arts of verpleegkundige.

Namens het medisch en verpleegkundig team

# Wat is een subcutaan implanteerbare poort?

De subcutane poort is een volledig implanteerbaar toedieningssysteem dat gebruikt wordt om medicatie in de bloedbaan toe te dienen.

De woorden 'subcutaan' (= onder de huid) en 'implanteerbaar' (= plaatsen) verwijzen ernaar dat de poort volledig onderhuids geplaatst wordt. De poort is van buitenaf te zien als een zwelling onder uw huid. Dagelijkse verzorging is niet nodig en de poort heeft geen invloed op uw dagelijkse activiteiten.

De poort is gemaakt van speciaal medisch gekeurde materialen en is ontworpen voor veilig en langdurig gebruik in het menselijk lichaam.


## Hoe ziet de poort eruit?

De poort is een kunststof of metalen schijfje met een doorsnede van ongeveer 2 à 3 cm, met een rubberen injectieplaats. Hierdoor is de rubber makkelijk te vinden op het oppervlak van uw huid en kunnen injecties snel en makkelijk plaatsvinden. De rubber is gemaakt van een siliconenmateriaal dat zichzelf na gebruik weer afsluit. Hierdoor kan de poort 1000 tot 2000 keer geprikt worden met een speciale naald.

Aan de onderzijde van de poort is een dunne flexibele slang aangebracht, dit is de poortkatheter die in een groot bloedvat wordt ingebracht.



# Hoe wordt de poort geplaatst?



De subcutane poort wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep geplaatst. Dit gebeurt onder algemene narcose.

Uw arts zal de poort plaatsen waar dat voor uw behandeling de meest geschikte plaats is.

Meestal wordt de poort geplaatst op de borstkast net onder het sleutelbeen.

De chirurgische procedure is eenvoudig en veroorzaakt weinig ongemak. Meestal mag u dezelfde dag naar huis.

In de eerste dagen na de ingreep is de wonde meestal bedekt door een verband. De huid die over de poort ligt kan gezwollen en gevoelig zijn.

Als het nodig is, kan de poort onmiddellijk gebruikt worden.


Tijdens de eerste paar dagen na de ingreep is het belangrijk dat u geen zware inspanningen of belastende activiteiten verricht.

Eenmaal onder de huid geplaatst, is de poort klaar om op een eenvoudige wijze medicatie in de bloedbaan te brengen of om bloedstalen af te nemen.

Om toegang tot de poort te krijgen wordt met een speciale naald door de huid geprikt. Als men de poort aanklikt kort nadat deze geplaatst is, kan dit pijn doen van de wonde die nog aanwezig is. Na verloop van tijd wordt deze pijn bij het aanpakken minder en primeert het comfort, namelijk de beweegbaarheid van de armen en het sparen van de oppervlakkige bloedvaten.

De naald, bevestigd aan een spuit, wordt door de rubber geprikt tot op de bodem van het reservoir.

De medicatie of vloeistoffen gaan via de naald in het reservoir en komen langs de katheter direct in de bloedcirculatie.



## Verzorging van uw subcutane poort

De hechtingen van de wonde worden meestal na tien dagen verwijderd. Als de wonde genezen is, hoeft u geen speciale verzorging toe te passen.

Na elke behandeling wordt de poort en de katheter doorgespoeld om te voorkomen dat het systeem verstopt. Deze spoeling moet minstens om de twaalf weken gebeuren.

## Mogelijke problemen met de subcutane poort

Hieronder vindt u een lijst met symptomen die kunnen optreden. Als één van deze symptomen optreedt of als zich andere ongewone symptomen voordoen, neemt u best onmiddellijk contact met uw behandelende arts.

- Ongemak, zwelling of pijn in de schouder, nek, hals of arm
- Pijn of roodheid op of rond de plaats van de poort
- Koorts of andere ongewone symptomen rond de wonde
- Een brandend gevoel bij het inbrengen van medicatie

# Antwoorden op veelgestelde vragen

## **Wat moet ik doen als ik een vraag heb of een probleem vermoed?**

Onthoud dat er na de ingreep wat roodheid en gevoeligheid rondom de wonde kan optreden. Normaal vermindert dit tijdens de eerste 48 uur. Als u echter ongebruikelijke veranderingen in de omgeving van de poort opmerkt zoals een sterke zwelling, roodheid of pijn, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of huisarts.

## **Heeft de poort invloed op mijn dagelijkse activiteiten?**

Probeer tijdens de eerste dagen nadat u de poort hebt gekregen, zware inspanningen te voorkomen. Als de wonde genezen is, kunt u uw gewone dagelijkse activiteiten zoals baden, zwemmen of joggen hervatten. Probeer drie weken de arm aan de kant van de geïmplanteerde poort te ontzien.

Uw arts of verpleegkundige kan uw vragen beantwoorden over speciale activiteiten en de beste tijd bepalen om deze te hervatten.

## **Is de poort zichtbaar?**

Er zal een klein opstaand gebied boven de poort zijn dat te voelen en te zien kan zijn afhankelijk van uw hoeveelheid vet- en spierweefsel. Ook is er een klein litteken zichtbaar, dat na enige tijd minder zichtbaar wordt.

## **Is het nodig de poort te verzorgen?**

Een verband is aanbevolen tijdens de wondgenezing. Daarna is een verband niet meer nodig. Als u een doorlopend infuus krijgt, zal een verband aangelegd worden om de naald goed te fixeren.

## **Betaalt mijn mutualiteit de poort?**

De mutualiteiten dekken de volledige plaatsings- en verzorgingskosten van de poort.



### **Doet de subcutane poort veiligheidssystemen (bijvoorbeeld in warenhuizen) in werking treden?**

Veiligheidssystemen zullen de meestal geringe hoeveelheid metaal van de poort niet ontdekken (recente modellen bevatten geen metaal meer). Zou dit toch problemen geven, toon dan uw 'identificatiebadge'. Hiermee kunt u aantonen dat uw drager bent van een subcutaan 'Geïmplanteerde Poortkatheter'.

### **Kan ik met mijn subcutane poortkatheter onder de NMR?**

U kunt hiermee zonder problemen onder de NMR. Wel altijd zonder poortkatheternaald want deze bevat metaal.

### **Hoe lang kan de subcutane poort blijven zitten?**

Zolang als uw arts het nodig vindt. De poort kan na overleg tussen patiënt en arts verwijderd worden. Dit gebeurt tijdens een korte ingreep onder lokale verdoving.



versie: 23 januari 2019

---

Noorderhart vzw  
Maesensveld 1  
B-3900 Pelt  
t 011 826 000  
info@noorderhart.be  
noorderhart.be