

Vermijden van een ernstige RSV-infectie en ziekenhuisopname bij uw baby.

Beste ouder(s),

Bronchiolitis is een frequent voorkomende infectie van de kleinere luchtwegen vooral bij zuigelingen en jonge kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar en veroorzaakt vooral bij kinderen jonger dan 1 jaar ernstige ademhalingsproblemen. Elk jaar worden er hierdoor duizenden kinderen jonger dan 6 tot 12 maanden in Belgische ziekenhuizen opgenomen.

De oorzaak is een virus, meestal RSV. RSV is zeer besmettelijk en komt bijna uitsluitend voor in de herfst- en wintermaanden (het zogenaamde 'RSV seizoen') als epidemie.

Er is er geen enkele oorzakelijke behandeling doeltreffend voor bronchiolitis (noch aerosols, noch kine, noch antibiotica, noch slijmoplossende siropen). Men kan enkel ademhalingsondersteuning (zuurstof of meer intensieve zorgen) bieden en sondevoeding of zo nodig infuus.

Momenteel wordt voorgesteld om baby's geboren vanaf 1 april 2024 te beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door een inspuiting met het middel Nirsevimab (Beyfortus®).

HET MIDDEL

- Is veilig
- Is bijna volledig terugbetaald op voorschrift van uw arts als u bent aangesloten bij een ziekenfonds en kost u:
 - 12 euro
 - 8 euro bij verhoogde tegemoetkoming
- Naam: Nirsevimab (Beyfortus®)
- Het is geen vaccin maar antistoffen en beschermt uw baby gedurende 1 volledig RSV-seizoen
- Vermindert het risico op RSV-infectie EN ziekenhuisopname
- Is een éénmalige inspuiting
- Is beschikbaar vanaf 1 oktober 2024 en wordt toegediend door uw kinderarts of huisarts
- Indien u tijdens de zwangerschap reeds het RSV-vaccin Abrysvo® kreeg toegediend, heeft u geen recht op terugbetaling.

INTERESSE OM UW BABY TE BESCHERMEN?

- Neem zo snel mogelijk (liefst voor september 2024) contact op met uw kinderarts en/of huisarts. Kinderartsen en huisartsen in België werken hierin samen en beschikken over dezelfde informatie. Kind&Gezin zal het product niet toedienen.
- Uw kinderarts of huisarts zullen:
 - u verder voorzien van alle informatie;
 - met u de mogelijkheden bespreken waar en wanneer het middel kan toegediend worden en welke stappen u moet ondernemen;
- Ook voor verdere vragen en meer informatie neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw kinderarts of huisarts.
- Uiteraard blijft het belangrijk om een aantal maatregelen in acht te nemen om besmetting met RSV of andere virussen te vermijden bij uw baby.

