

# OPPERVLAKKIGE SNIJWONDE

Spoedgevallen en MUG

 011 826 240

---

Mevrouw, meneer,

Er werd zonet bij u of uw familielid een wondzorg uitgevoerd op onze eenheid spoedgevallen. Om de wondheling zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we graag enkele aandachtspunten en tips mee. Indien de verzorging uitgevoerd zal worden door thuisverpleegkundigen, mag u deze fiche aan hen afgeven.

Iedere verbandwissel wordt steeds voorafgegaan door een grondige reiniging van de wonde. Reinig de wonde dan met lauw stromend water of met een reinigingsmiddel naar keuze (vb. Flamirins®).

Wanneer het een **vuile wonde** betreft, is verzorging 2 keer per dag aanbevolen. Ontsmet de wonde na reiniging met iso-Betadine® Dermicum en breng iso-Betadine® Gel aan/in. Doe dit met een steriel compres om bevuiling van de zalftube te voorkomen. Tot slot wordt er als bedekkend verband een zelfklevende pleister aangebracht. Na drie dagen mag u de verzorgingsfrequentie eventueel verlagen naar 1 keer per dag en de iso-Betadine® Gel zo nodig vervangen door Flaminal® hydro.

Wanneer het een **propere wonde** betreft, volstaat wondzorg 1 keer per dag. Breng na reiniging Flaminal® hydro aan/in. Doe dit met een steriel compres om bevuiling van de zalftube te voorkomen. Tot slot wordt er als bedekkend verband een zelfklevende pleister aangebracht.

De spoedarts en -verpleegkundige informeren u steeds over welke van deze twee behandelingen voor u van toepassing is.

## AANDACHTSPUNTEN

Observeer de wonde en de wondomgeving op infectietekens zoals roodheid, zwelling, warmte, toegenomen pijn en etter. In geval deze tekens aanwezig zijn, neemt u best contact met uw huisarts.



Flamirins®



iso-Betadine®  
Dermicum



iso-Betadine® gel



Flaminal® Hydro



Zelfklevende pleister

Voor de opvolging van uw wonde(n) of bij eventuele problemen kunt u een afspraak maken bij de verpleegkundig specialist wondzorg via [wondzorg.stomazorg@noorderhart.be](mailto:wondzorg.stomazorg@noorderhart.be).